

Aquest fullet li proporciona la informació necessària sobre els **tràmits i normes** a seguir en relació a la intervenció quirúrgica a la que serà sotmès/a.

Si té qualsevol dubte o pregunta sobre qualsevol d'aquests o altres punts, **NO DUBTI** de dirigir-se al personal de la consulta externa d'urologia.

Protocol Intervenció Quirúrgica Estenosis Uretral

i

- *Consentiment Informat
- *Normes a seguir
- *Recomanacions
- *Signes d'alerta

QUÈ és una Estenosis Uretral?

És un estretament (estenosi) a l'interior de la uretra que disminueix el diàmetre d'aquesta. La intervenció quirúrgica es practica introduint un aparell d'endoscòpia (uretròtomo) per la uretra amb una fulla que ens permetrà seccionar la zona on es troba l'estenosi.

QUAN es decideix si l'operen?

El/la metge/ssa l'informarà durant la visita de si vostè serà o no intervingut/da.

Haurà de llegir un document anomenat *CONSENTIMENT INFORMAT* i signar-lo si està d'acord amb el mateix.

A partir d'aquest moment vostè serà programat/da per a la intervenció quirúrgica.

Se li indicaran dos dies per fer les proves preoperatories.

QUIN dia li fan les proves necessàries (preoperatori) i quíndia l'operen?

Un dia li faran la visita d'infermeria, anàlisi de sang i radiografia. Ha de venir en dejú (5-6 hores) i amb la llista de tota la medicació que està prenent actualment.

Un altre dia (aproximadament al cap d'una setmana) el/la visitarà el/la metge/ssa anestesiòleg/a per valorar el resultat de les proves.

El/la trucarem per telèfon per dir-li el dia que ha d'ingressar.

COM preparar-se per la intervenció

Ha d'estar en dejú durant 8 hores abans de l'ingrés (inclòs no beure aigua)

Recordi portar la medicació que està prenent actualment.

RECOMANACIONS a l'alta

Marxarà d'alta amb sonda vesical. Durant el dia la connectarà a una bossa que lligarà a la cama i per la nit una altra bossa més gran (2 litres) per poder descansar.

S'ha de dutxar, col·locant un tap a la sonda.

Ha de passejar. No ha de fer repòs al llit.

Ha de seguir la seva dieta habitual.

Beure força quantitat de líquids (aprox. 2 litres diaris).

Si abans de la intervenció seguia algun tractament farmacològic, segueixi prenent la mateixa medicació, si no és que se li indica el contrari.

S'ha de prendre la medicació analgèsica que li ha prescrit el/la metge/ssa, si té dolor.

Ha d'anar a la visita del/de la metge/ssa que li han programat per control.

SIGNES d'alerta

Temperatura superior a 38°.

Si té molt dolor i aquest no cedeix amb l'analgèsic que li han receptat.

Si la sonda vesical no funciona.



SERVEI D'URGÈNCIES:
Telèfon: 93 306 99 00
24h